

Oftalmolojide Temaruz Testleri

H. OR^a , S. ERDA^b

^a Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (Araştırma Görevlisi)
EDİRNE

^b Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
(Doç. Dr.) EDİRNE

ÖZET :

Temaruzun çeşitli tipleri vardır. Simülasyon, ekzejerasyon, yanlış atıf ve dissimilasyon. Temaruzun derecesine göre çeşitli testler bulunmuştur : Total körlük, tek taraflı körlük, ambliyopi, renk körlükleri, gönmt alanı kaybı için testler, tüm testlerdeki "tuzak" ların özelliği hastanın tekniği bilmemesidir.

THE TESTS FOR MALINGERING IN OPHTHALMOLOGY

SUMMARY :

There are many kinds of malingering : Simulation, false distribution, dissimulation. Different types of tests depending on the degree of malingering have been found : Bilateral amaurosis, colour vision deficiency, amblyopia, defects in the visual field : The important point of the traps in these tests is that the patient isn't aware of the technique.

Temaruz, belli ve arzu edilen bir sonuca ulaşmak için olmayan bir hastalık veya fonksiyon bozukluğunun varlığını hekimi yanlış yola sevk ederek kabul ettirmeye çalışmaktır¹.

Temel düşünce, hastayı yanlış olarak yalancı tanımlamanın bir yalancıyı tanımamaktan daha kötü olmasıdır².

Temaruzun Çeşitli Tipleri Vardır :

1 — *Simülasyon* : Olmayan bir hastalığı veya bozukluğu kabul ettirmeye çalışmak,

2 — *Ekzejerasyon* : Mevcut bir durumu olduğundan daha ağır göstermeye çalışmak,

3 — *Yanlış atıf (False distribution)* : Bir hastalık, yaralanma veya fonksiyon kaybını hakiki sebebinden ayrı bir olaya bağlamaya çalışmak,

4 — *Dissimilasyon* : Mevcut bir hastalık veya fonksiyon bozukluğunu yok veya azmış gibi göstermeye çalışmaktır,

1,2 ve 3 Sosyal Hizmetler veya tehlikeli işlerden kaçmak yada maddi bir menfaat için yapılan pozitif temaruzlardır¹.

Tembel veya muayeneden kaçan temaruzcu başkalarını, psikonörotik ve muayeneye can atan histerik karakterli ise kendini kandırmaya çalışır. Histeride görülen psikonevroz, hayatın zorluklarına karşı yanlış bir cevabın yerleşmesidir.

1 — *Endişe ve korku reaksiyonu* : Körlük korkusu, flu görmeye,

2 — *Sabit fikir reaksiyonu* : Bir çok semptomun bir arada acaip olmasına,

3 — *Histerik reaksiyon* : Tek semptom (Fonksiyon yok veya az) neden olur^{1, 2}.

Temaruz testleri yukarıdaki nedenlerle oluşan semptomların mevcut olmadığını göstermeye yöneliktir ve semptomun şiddetine göre değişik testler vardır. Testler çabuk, emin ve şaşırtıcı yapılmalıdır. Testlerdeki "tuzak"ların özelliği, tekniğini hastanın bilmemesidir. Hastaya inanıyormuş gibi, görülürse, hastanın dikkati dağılır ve daha kolay teşhis konulur^{1, 2, 3}. Ayrıca muayeneden önce hastanın kimliğini iyice belirlemek gerekir³.

Fonksiyonel Total Körlük Testleri :

1 — *Pupilla refleksi (direkt ve indirekt)* : Normal ışık refleksi vizyonun varlığına işarettir, hastanın testten önce midriyatik damla kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek gerekir.

2 — *Kapak refleksi* : Vizyonu olan gözde, göze doğru ani hareket sonucu oluşur.

3 — Gözleri kapatılarak odada dolaştırılır, imza attırılır. Gerçek kör bunları rahatça yapar.

4 — *Schmidt - Rimpler testi* : Hastaya efine bakması söylenir, kör bakar, mütemarız başka yöne bakar. İki işaret parmağını birleştirmeyi ise kör yapar, mütemarız yapamaz.

5 — *Grafenin fiksasyon testi* : Bir ışık kaynağının karşısında duran "gör-meyen" gözün önüne 12 diyoptrilik cam konulursa gözde hareket gözlenir.

6 — *Bach'ın Optokinetik nistagmüs testi* : Nistagmüs oluşuyorsa vizyon mevcut demektir.

7 — *Kafa rotasyonu nistagmüsü testi* : Hastanın başı pasif olarak 30° sağa ve sola çevrilince nistagmüs oluşuyorsa bu körlüğe, gözler orjinal pozisyonlarında kalırsa fiksasyon için yeterli vizyonun olduğuna işarettir.

OFTALMOLOJIDE TEMARUZ TESTLERİ

Ayrıca hastalar devamlı müşahade altında tutulmalıdırlar. Gerçek körler yemek yemek, sigara yakmak, merdiven çıkmak gibi günlük işleri rahatça yaparlar, mütemarız ise zorlanır.

Pupilla ışık refleksi, eğer lezyon Corpus geniculatum laterale ile vizüel korteks arasında ise, normaldir^{1, 2, 3}.

Tek Taraflı Körlük Temaruzu İçin Testler :

Histeride çift, temaruzda ise tek taraflı körlük temaruzu görülür. Işık refleksi çift taraflı eşitse vizyon normaldir. Işık refleksinin zayıf, pupillanın midriyatik olması tek taraflı görme bozukluğuna işarettir.

1 — *Fiksasyon testleri* : (antidiplojik testler) Prizma görmeyen gözün önüne koyunca kompensatuar hareket varsa binoküler vizyon var demektir.

WELZ : Hasta okurken tabanı dışta 10-20 prizma - diyoptrilik cam şüpheli gözün önüne konunca oluşan içe deviasyon vizyonun varlığına işarettir.

DUANE : Okurken şüpheli gözün önüne tabanı aşağıda 4 prizma-diyoptrilik cam konur, eğer hasta okumayı keserse diplopi oluşmuş demektir ve binoküler vizyonun varlığına işarettir.

2 — *Diplopi Testleri* : Prizmalar yardımı ile yapılır.

— *Von-Grafe* : Önce monoküler, sonra binoküler diplopi oluşturulur. Monoküler diplopi için tek gözün, binoküler diplopi için ise her iki gözün vizyonu gerektiğinden mütemarız belirlenebilir.

— Görmeyen gözün önüne vertikal prizma konularak hastaya merdiven inip çıkartılır. Oluşan diplopi nedeniyle mütemarız yapamaz.

3 — *Fizyolojik diplopi testleri (Wessely)* : Özel hazırlanmış iki tüpten baktırılıp uzaktaki bir obje fikse ettirilir ve tüplerin önüne bir parmak tutulur. Fizyolojik diplopi oluşur ve çift gören mütemarızdır.

4 — *Psödoskopik Testler* : Ayna veya perdelemeler vasıtasıyla iyi olan gözü ile gördüğünü sanırken kötü gözü ile görür. (Fles kutusu, Chauvel kutusu, Marechal kutusu, Bishop - Harman apareyi, Remy diploskobu).

5 — *Sisteme Testleri* : Prensibi iki göz açıkken iyi gözün görmesini bzmaktır. Muayene sırasında kötü gözünü kapaması engellenir.

a) *Schenkl Testi* : Hasta okurken iyi gözünün önüne yüksek miyop veya hipermetrop cam konur. (mesela iyi gözün önüne + 12 diyoptri, kötü gözün önüne — 0,25, diyoptri). Eğer okumaya devam ederse "kötü" gözüyle görüyor demektir.

b) *Harlan Testi*: Hasta 17 cm'den okurken (yakın eşeli) tashihi yapılmış iyi önüne + 6,00 diyotrilik cam konur, eğer okumaya devam ederse diğer gözünü kullanıyordur.

3 — *Jackson Testi*: İyi gözün önüne 5 ve -5 diyoptrilik silindirik cam konur, okurken iki cam birbirinden 15° ayrılır, eğer okumaya devam ediyorsa kötü gözüyle okuyordur.

4 — *Gradle Testi*: Polaroid test; İyi gözün önüne eksenleri paralel iki polaroid disk konur ve biri 90° hareket ettirilir. Okumaya devam ediyorsa kötü gözüyle okuyor demektir^{1, 2, 3}.

Amblyopi Tamaruzu İçin Testler :

(Bilateral görme bozukluğu) Eşellerin en alt sıralarını okumayan müteharızlar için 3-5-6 m'lik eşeller, boyları büyültebilen harfler, en büyük şekilde en küçük optik kompenantın bulunduğu Thibaudet vardır. Böylece hasta düşük vizyon verdiğini zannederken yüksek vizyon verir.

— *Renkli cam ve eşeller*: Komplemetar renklerle yazılmış snellen eşellerdir. Kırmızı cam ile sadece kırmızıları, yeşil cam ile sadece yeşilleri görür: FRIEND Testi, her iki gözle de görebiliyor ise kelimenin tümünü okur, yoksa kelimelerin sadece bir kısmını okur. FRIEND (FIN ve RED olarak), uygun bir kelime bulunup Türkçe olarak da uygulanabilir^{1, 2}.

Haselberg eşelleri FRIEND testiyle aynı tekniğe dayanır³.

Wagner testi: Pembe zemin üzerinde siyah ve beyaz harflerden oluşur, iyi göz önüne kırmızı cam konunca beyaz harfleri okuyamaz.

— *Stereoskopik testler*: Ancak her iki gözün görmesi ile tamamlanabilen harf ve şekillerden oluşur.

— *Karanlık adaptasyon testleri (1912, Beckmann)*: Karanlığa adapte bir gözün kapatılınca adaptasyonunu muhafaza etmesine, dayanılarak kötü göz kapatılır. İyi göz ışığa adapte edilerek hasta yeniden karanlık odaya getirilir ve kapalı göz açılır, eğer karanlığa adapte ise kötü gözü ile görüyor demektir¹.

Görme Alanı Kaybı Simülasyonu :

— Görme alanı çeşitli uzaklıklardan alınır. Hastalar mesafe arttıkça görme alanlarının ufaldığını düşünürler^{1, 3}

OPTALMOLOJIDE TEMARUZ TESTLERİ

Renk Körtükleri :

Anomaloskoptaki çeşitli ayarlanmalarla ortaya çıkarılır².

Rissimülasyon :

Bilinmeyen çeşitli eşeller kullanılır. Renk görme anomaloskop, ışık hissi kendi kendine kaydeden adaptometre ile muayene edilir^{1, 2}.

KAYNAKLAR :

1. First T. : Temaruz, Göz ve hastalıkları, S : 597 — 606, 2. cilt, Emel Matbaacılık Sanayi, Ankara, 1981.
2. Lyle T. K.; Cross A. G., Cook C. A. : Ocular neuroses and malingering, May and Worth's Manual of Diseases of the Eye, p : 705 — 718, Bailliere Tindall Cassell, London, 1968.
3. Pau — Axenfeld. : Vortauschung von Augenschaden, Lehrbuch der Augenheilkunde. p : 64 — 65 Gusav — Fischer — Verlag, Stuttgart - Newyork, 1980.